


# *Novas guidelines ERC 2005*



**E**uropean  
**R**esuscitation  
**C**ouncil



**American Heart  
Association®**



Fighting Heart Disease and Stroke


# ***Principais Modificações***

- Importância do número e eficácia das Compressões Torácicas.
- Relação compressão/ventilação única para todos os socorristas que actuam sozinhos (excepto RN).
- Cada ventilação deve ser aplicada durante 1 seg. e deve produzir uma elevação do tórax visível.
- Aplicação de um único choque. Verificar o ritmo a cada 2 min.
- Aprovação da recomendação ILCOR 2003 para utilização de DAE em crianças com idade superior a 1 ano utilizando dispositivos atenuadores de corrente.

# ***Novas Recomendações***

- Fazer o diagnóstico de **PCR** se a vítima está **inconsciente** e **não respira**.
- Colocar as **mãos no centro do tórax** sem utilizar o método do “rebordo costal”.
- Cada **insuflação** tem a duração de **1 seg.** e não 2 seg.
- Relação **compressão/ventilação** em todas as vítimas adultas **30/2**. Utilizar a mesma relação em crianças no caso do reanimador ser um leigo.
- No caso da vítima ser um **adulto** iniciar as **compressões torácicas logo após o diagnóstico de PCR**.

# Adult Basic Life Support



# ***Novo Algoritmo SBV***

